上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
長壽書彙選第一集	一冊	實售大洋六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
婦女病全集	二冊	實售大洋一元
胃病研究全集	二冊	實售大洋一元
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保腦新書	一冊	實售大洋四角
怪病奇治	一冊	實售大洋八角
花柳病治療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂	二冊	實售大洋二元四角

書名	冊數	價目
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
性病指南	一冊	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一冊	實售大洋二元五角
國民醫藥須知初集	二冊	實售大洋二元五角
國民醫藥須知二集	一冊	實售大洋二元五角
中西醫藥講義	十六冊	實售大洋八元
中國針灸治療學	一冊	實售大洋三元八角
遺精廣論	一冊	實售大洋五角
求孕與避孕	一冊	實售大洋五角

上海三馬路雲南路轉角

長壽

于右任

每份四分 第七十八期

中華民國念二年十二月一日

每逢星期五出版 全年五十期 連郵二元 國外加倍

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

◉內政部登記證警字第一一二七號◉

◉本報特聘請 吳之屏 方家楨 大律師為常年法律顧問◉

□本期目錄

□卷頭語
弱國滅種之淋病
□小兒病
小兒痘疹
肺脹與痧子之關係
小兒吐瀉與乳母脚氣之關係
□青年病
遺精與淋病
遺精病論治(續)
精少立愈法
□實用驗方
治紅眼
治兒枕塊痛
火燙傷妙藥
疔腮特效藥
清燐承氣湯
耳爛家藏良方
□醫藥顧問
病後餘患
舊病復發
□婦女病
難產之研究
經帶病治法大要
經閉當分虛實
□普通病
吐血與職業
瘧疾自療法
硫黃治疥癬
豬胆汁治黃疸
□用藥指南
柴胡藥性之淺解

□弱國滅種之淋病

(佚)

馬苦氏謂德國盲者所損失之生產力。與養育之費用。合計每年國家損失二千萬馬克。卽一千萬圓。是尚不過少數盲者所生之損失。若血氣旺盛之青年如學生役人商人勞働者。一罹淋病。則其爲休業及死亡。所生國家生產力之損失。爲兵士罹淋病所失之戰鬥力。爲子宮淋所發之流產早產夭死及不姙症。凡人口蕃殖上所蒙之損害。苟一一計算之。則國家之損失。實在幾億萬元以上。

淋病者上自社會高等人。及最下等人。各階級中均受蔓延。故其損害非常可懼。決非虎列剌。百斯篤。赤痢等可比。噫。今尚可視爲粘膜加答兒。而謂不足注意耶。

以此陰險可畏爲社會勁敵之淋病。告世人以可恐之狀。且與以防禦之武器。自立陣頭。以講勦滅其敵之道者。皆我醫者之職。而此卽救個人。保家族。助社會之健全發達。造國家富强基礎之一端也。

實用驗方

□治紅眼

治紅眼有二法。(一)晨起盥洗後。以鹽研至極細。用手指濕水沾入兩太陽穴。不數日卽愈(按此法初患時效)(二)每於飲燒酒時。將箸沾少許。抹上下眼皮。但不可流入眼內。酒家如能注意行之。可終身不患紅眼。此吾友喩樸若所云。(按此係預防紅眼法。予曾親見喩君行之。)

□治兒枕塊痛

丙辰夏。內子產四產後。忽患兒枕塊痛。遍醫不效。後唔同寅某君云。可覓江西紫碗之草。拂去塵土。剪成寸許。煎服卽愈。試之果驗。按兒枕塊痛。係婦女產後瘀致血所。紫碗之草能行血故也。

□火燙傷妙藥

葉伯臯先生傳。地楡研末。撒敷湯火傷最善。近日舍弟之幼子爲滾水傷腿足甚劇。初用西醫藥頗痛楚。旋用地楡研末撒之。則痛止。十餘日。而肌膚生長完善矣。按此方至鴻緒證治全生中亦載之。凡湯火傷最忌冷水。宜速浸油中。或浸小便中。洋油亦極佳。地楡末則或用麻油棻油而敷。或乾撒。或水調均可。

□疔腮特效藥

疔腮。平潭俗名豬牙瘴。生於耳下兩腮。焮腫刺痛。或發熱惡寒。或牽引頭痛。潭人以青靛化調醋塗抹。或有用生南星磨醋。時時抹之。內服葛根牛蒡板蘭根銀翹。煎湯溫服。效驗如神。經余歷見頗多。誠治疔腮之特效藥也。(按)生南星及青靛皆有消散之效。葛根板蘭根等。又有清熱之能。疔腮一症。多由熱毒內蘊而起。此法內清外散。故有特效。

□消燐承氣湯

洋火柴爲中華廿二省普通應用特品。硝硫雖有暴烈性質。尚易用藥消解。惟燐毒係陰電所結。最難消滅。現今愚夫笨婦。心有憤鬱。每藉此物爲尋短見基礎。然入口歸胃達腸。無形質。有毒性染綴腸胃內膜。嘔吐不能出。瀉利不能下。其爲煙焰毒火焚燒。喑斃者。每年不知凡幾。言念及此。能不悽然。今覓得妙方。用自然銅二兩。寒水石六錢。滑石塊一兩。綠豆衣五錢。野黑豆七錢。錦紋軍四錢。小枳實三錢。粉甘草一錢五分。玄明粉三錢。名消燐承氣湯。清水濃煎頓服。輕者一二劑。重者三四劑。自能將火毒化消淨盡。全愈。此方靈驗異常。萬勿秘藏。刻出宣布。普渡羣迷。功德無量。

□耳爛家藏良方

余嘗見友人家施送耳爛藥。來求者。日必數次。鄙人鄰居亦有患此者。先後代取。用後卽愈。茲詢得其方。乃鷄嘴骨。(卽鷄嘴夾骨)煅灰。存性研末。摻患處。不過三四日卽愈。

●求孕與避孕 再版出書

▲指示男女雙方不孕之原理以及求孕訣門
▲公開女子因體虛而怕孕之一切避孕良方
▲解決男子因經濟困難而欲節制生育問題

▲上集生理篇
(一)成孕之工具
◎男子之生殖器官
◎種子之主要成分
◎女子姙娠之主要工具
◎月經來潮
(二)成孕之原理
◎男子交接機能及生殖機能之大研究
◎胎成男女之原理
◎雙胎之研究
◎婦女生育遲早之原因
▲中集求孕篇
(一)男子不孕之原因及治法
甲 腎病
◎哀哉縱慾之徒
◎手淫之危害
◎早泄
◎見色流精
◎生殖器不發育
◎陰萎
乙 花柳
◎花柳病之原因及傳變
◎梅毒之實驗治法
◎淋濁驗方
◎宴會中所得之白濁良方
◎老白濁最有效方
(二)女子不孕之原因及治法
甲 月經不調
◎調經之大綱
◎經閉有虛有實
◎婦女經閉成癆
◎逆經痛經治驗記
◎月經色異之鑑別及治法
◎經已行復止
乙 帶下
◎帶下之預防
◎白帶概論
◎帶下首在調養
◎白帶自療法
◎治女子白帶方
丙 下虛
◎子宮寒冷之治法
◎婦人下元虛憊不孕之治法
丁 感覺異常
◎陰戶作痛之療法
◎陰戶奇癢之療法
◎婦人缺乏淫情之治法
戊 生理關係
◎女子五不孕之研究
◎體肥不孕之治法
◎婦人不能受精之治法
己 其他
◎一個氣鬱不孕的女子
◎房後子宮出血之治法
◎婦人嫉妬不孕之治法
◎骨蒸夜熱不孕之治法
(三)求孕之方法
甲 節慾
◎求孕與節慾
◎寡慾多生子
◎求孕先宜聚精
乙 房中術
◎自然的求孕法
◎求孕問題
◎早泄者求子法
丙 服藥
◎種子術
◎種子三方
◎婦女種子方
◎顧氏家傳種子方
◎種子簡效方
丁 其他
◎求嗣之饜禳法
◎求子與娶妾
(四)流產與安胎
甲 流產
◎暗產
◎小產與帶下之關係
◎小產之三大原因
◎半產之研究
乙 安胎
◎安胎之研究
◎房事動胎
◎獨出心裁之安胎法
◎安胎經驗方
▲下集避孕篇
甲 避孕原因
◎避孕有關於人種的強弱
◎爲反對墮胎而避孕
◎避孕所以增進婦人之康健
乙 人工避孕
◎人工避孕法
◎避孕良法
◎不合衛生之避孕法
丙 藥物避孕
◎避孕法之種種
◎實驗得來之避孕術
◎避孕用殺虫藥之危險

□每冊實售大洋五角外埠另加寄費九分□

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

小兒病

小兒痘疹

（沈奎伯）

近日小兒。感觸時疫。發生痘疹。往往半出不出。或已出而又內陷。其症率多不治。良用惻然。頃得一簡便驗方。試已神效。用亟披露。顧關懷保赤者。廣爲宣傳。全活嬰孩。功德莫大焉。生黃豆一碗。水泡透。搗爛。入鍋內。煎濃汁。如豆腐漿一樣。再青竹根一段。約半尺長。煎滾水。冲入豆糊內。時時以湯勻。調與兒服。有起死回生之功。黃豆係人家常有之物。青竹根。亦容易覓取。方之簡便。無過於此。余已用之數十次。皆效。應驗如神。幸勿視爲通常驗方可也。

肺脹與痧子之關係

郭柏良

肺脹一名肺炎。脹者言其外候。炎者言其內候。本症因風寒挾邪。入於氣管。或腸部。以致內膜發炎。其證狀爲咳嗽。呼吸困難。或則體溫加高。其甚者因呼吸困難而發爲喘促之狀。胸脇擴張。故有肺症與肺炎之稱。本症之患者。以小兒爲最多。肺脹之原因甚多。而於痧子期。最易釀成。當痧子初見之時。口腔。喉頭。氣管等黏膜。類多發炎。故發爲咳嗽等證。如痧子順利。見點以後。邪向上達。炎證逐漸消退。外候亦漸次轉輕。如於痧子初期。將護不愼。以致不能發見痧點。或一現而即隱伏。則邪無外達之機。炎證不能消退。勢必咳嗽加甚。漸至呼吸不利。氣急鼻煽。欲哭無淚。甚則因肺之呼吸面縮小。體肉養氣缺乏。口唇及指甲。呈青藍色。四肢厥冷。兩脈頻數。陷於不治。

春秋兩季。爲痧子流行之時。舊歷二三月之交，流行尤廣。痧子之順利者。原可不必服藥。正因爲父母者。缺乏此種常識。防護不周。往往發生變化。轉爲危篤之症。在痧子流行之期。變症最多。而肺脹一症。尤爲首屈一指。本症治法。以順氣平喘，化痰治咳爲最要。如炙麻黃。葶藶子。白芥子。炙蘇子。杏仁。半夏。陳皮。瓜蔞皮等。可以量症之輕重而施用之。甚者用消腫膏塗按胸部。病勢亦可減輕。

小兒吐瀉與乳母脚氣之關係

尤學周

小兒泄瀉。由於受寒或不消化所致。泄瀉而兼嘔吐。大多爲消化器病。蓋小兒無七情之紛擾。所患病症。非感受外寒。即內傷飲食。此常人所習知者。關於小兒之吐瀉問題。當有專論。茲所言者。乃吐瀉症中之一例外問題。

小兒吐瀉。最爲普遍。緣小兒食慾無節。不加限制。往往造成不消化之證候。發爲吐瀉。故通常治小兒吐瀉方法。大多注重於消導方面。惟以余個人之經驗。小兒因脚氣而成吐瀉者。所見亦甚多。此症多發於生後二月至六月之小兒。由患脚氣之乳媼傳染而來。

小兒哺乳。以生母之乳爲最合。惟有錢階級之婦女。但求個人之舒適。不願自討苦吃。哺養乳兒。故多以是職委諸乳傭。此種乳傭。其乳汁之成分是否佳良。是否合於乳兒之營養。不可不加以注意。然一般雇傭乳媼者因急於應用。不暇細審。以致影響於小兒身體之康健者。比比然也。即乳媼之乳汁佳良。已合於乳兒之營養矣。然此輩乳傭。大都來自內地。不服水土。猝然發生疾病者有之。滬上鄰接海濱。地土卑濕。最易發生脚氣之症。初雇乳傭。謹愼之家。亦有令其就醫生診斷。有無傳染疾病。以定去取。事雖周密。然初至滬上者。有否脚氣。不能立定。亦有因來滬未久。診斷時尚未傳染。稍久而始發生者。則又防不勝防矣。

本病之發生。先見嘔吐。有一日僅嘔吐一二回者。亦有一二回以上者。同時發生泄瀉。顏色漸轉蒼白。煩躁不悅。睡眠不安。易啼哭。脈數。而此時如不加詳細考察。認爲普通吐瀉。治以消導。或不合於脚氣症之治法。則證情逐漸加重。脈數。呼吸增加。口唇呈青藍色。哭聲不揚。聲音嘶嗄。或完全無聲。以致不救。滬上育兒之家。因乳媼脚氣。而賊及小兒性命者。不可勝計。此因家長注意不周。醫家診察不精。一誤再誤所致。大凡小兒嘔吐之證狀。爲呼吸增加。聲音嘶嗄。上眼瞼下垂不起。（此種現象。多認爲力虧。大誤大誤。）尿量減少。啼哭時口唇發青藍等。然此數證。並不完全發現。其特有之點。爲呼吸及脈搏之增加。臨診時最宜注意。

朱振聲醫士
上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問

診例
（甲）門診一元　號金不取
（乙）出診四元　路遠遞加
（丙）膏丸方四元　隔日取件
（丁）外埠問病二元　原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時　出診四時以後
診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家
電話　九一四九二
掛號處啓

青年病

遺精與淋病

——（林小川）——

感患淋濁病者。有一極普通的症狀。即無論在急性或慢性期內。往往招致遺精。一般理想。咸以爲自然。而少有究詰其原因者。更有遺精期內。適淋病進入極痠慢性。他覺自覺的症狀悉隱時。覺作尋常遺精治療。而一般昧於醫學常識者。並有遺精積久能成濁。或則以爲白濁即敗精。於是治療的基礎。根本即築在遺精一點上。完全忘却淋病病理。則主點之錯觀。當然難愈矣。吾人爲搜求其眞諦。請先述生理的解剖、接在攝護腺稍上。介乎直腸及膀胱之間。有兩個精囊。上部各離。下部逐漸接近而綜合爲一。直接輸精管而達後尿道部位置之精阜開口。該部在人生意義上估價。殊爲嚴重。蓋歷來學者的研究。已確定該部除有存儲與翼護精蟲之功能外。並具吸收一切不利睪丸製造精蟲的分泌作用也。

淋病達後尿道部份時。炎衝波及精阜。乃起輸精管炎。由漸而入精囊而起精囊炎。自管壁之腫脹以致強直。同時因刺激乃致勃起而遺精。在急性者：因腫脹之故。射精乃劇痛。或且混有血液。惟以性神經之遺受刺激。患者乃常覺尿道內有蟻行擦。同時並感情慾性的快適。故時時勃舉。連續遺精。至於在慢性者。最是可怖。蓋病者雖同起後尿道炎及攝護腺炎與本症。然一般殆皆治愈各症而殘留本症。故許多患過淋病者。即在一切經過都見良好。遺精却依然多至。亦有在初期勃舉行得短時間的興奮。駭漸則因情慾性神經之迭受橫暴打擊而致衰弱。或乃擴大而成全身症狀。顯有未老先衰等病態。或覺不幸而轉成陰萎。則不獨生育不能。亦且整個剝削人生眞趣矣。

有本症之病者。往往於大便或放尿之後。外尿道口擠出點濁精液。此在醫學上稱爲精液漏。檢視其中可發現不動性精蟲。殊爲診斷上之一大佐助也。而在平常之遺精者。檢視其精蟲固多少存具活潑性能在焉。

遺精病論治（續）

黃天則

（三）多食蔬菜菓品。其美味濃厚如葷品以少食爲宜。

（四）烟酒富有刺激性。務宜戒絕。

以上三項。能實行之。則淫慾之念。可續漸消滅。然後進而求諸藥療。庶幾膺功獲奏也。

（B）藥療

夫治療遺精病。金匱要略有三方焉。一曰桂枝加龍骨牡蠣湯。二曰小建中湯。三曰腎氣丸。三方之爲用。各有不同。茲分述之。

（1.）桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩　大棗十二枚　龍骨　牡蠣各三兩

桂枝加龍骨牡蠣湯者。乃興奮神經。和緩急迫之方也。蓋桂枝含有揮發油。能刺激神經。使衰弱者轉而令其興奮。生薑亦含有揮發油。能刺激胃粘膜。促進其消化作用。使食慾亢進。以遺精病每發見消化不良症故也。至芍藥大棗甘草。據湯本氏個人經驗。謂凡用芍藥甘草大棗之證。必診得筋肉攣急。而於直腹筋最爲明確易觸知。故診得此筋肉攣急。即可爲應用三藥之目標。而東洞翁亦云。甘草。主治急迫也。芍藥。主治結實而拘攣也。大棗。主治攣引強急也。觀此說。則可知此三藥確爲和緩劑。故仲景用之。而其主諸。所以有少腹弦急也。加龍骨牡蠣者。以失精病每有心悸之症。而牡蠣藥徵謂主胸腹之動。所謂胸腹之動者。意即心悸之代名詞。故此用之以鎮定心悸。且此藥含多量之炭酸鈣。有制酸作用。亦足以佐生薑促進胃之消化作用也。若夫龍骨。藥徵謂主臍下之動。因此湯本氏遂謂其爲收斂藥之一種。故亦用之。蓋恐患者由遺精而轉滑精。故用以斂其射精管。所以防患未然也。

（2.）小建中湯

桂枝　生薑各三兩　芍藥六兩　炙甘草二兩　大棗十二枚　膠飴一升

小建中湯者。即桂枝湯倍芍藥加飴糖之方也。桂枝湯爲興奮神經和緩急迫之方。既如上述。然其倍加芍藥者。所以增進其和緩組織之力也。故仲景凡用本湯之症。多兼有腹中痛裏急等症者。即斯故耳。其加飴糖者。以飴糖含有麥芽糖。爲炭水化合物之可容性。易消化。可爲消化不良症之補劑。是以仲景於傷寒二三日。心中悸煩。無腹中痛裏急等症。亦用之者。以其爲補劑也。且本條首揭虛勞。復曰裏急。腹中痛。故不得不以本方一方面補其虛。一方面緩其急也。

精少立愈法

景歧

男子本原虛乏。則射精稀少。不能直達子宮。而交合遂不能酣暢。自醫之法。宜用固本丸治之。方以去心麥冬。酒製菟絲子。酒蒸搗熟地黃。酒浸天門冬。茯神。五倍子。酒浸搗乾地黃各四兩。微炒淮山藥三兩。去皮心蓮子。黨參。枸杞各二兩。共研爲末。密和爲丸。如梧子大。用淡鹽湯送服。每服七八十粒。

用藥指南

朱振聲

(四十四)柴胡(味苦微寒入肝與胆)

□主傷寒瘧疾寒熱往來　傷寒之病。初在太陽。次入陽明。再次入少陽。三陽有邪。必發寒熱。然同一寒熱病。用藥各有各經之不同。且各藥亦有入各經之特長。太陽之寒熱。淅淅惡寒。翕翕發熱。一日之間。次數無定。陽明之寒熱。始而形寒。繼則但熱不寒。少陽之寒熱。先寒後熱。天明卽退。一日一次。日有定時。傷寒篇中之少陽病。卽內經之瘧疾。瘧疾之生也。因夏傷於暑。熱氣盛藏於皮膚之內。腸胃之外。半表半裏之間。少陽所主之界。俟至秋凉。新寒外束。引動伏邪。陰陽相搏。邪入與陰爭。陰勝則寒。出與陽爭。陽勝則熱。輕者一日一作。且日作益早。重者間日或二日一作。且日作益晏。柴胡專入少陽經之品。性主上升。能透伏邪外達。和解半表半裏之機。樞機調和。則無邪與陰陽相爭。寒熱退。瘧疾止。

□嘔吐脅痛口苦耳聾　足少陽之脉。起於目銳眥。下耳後。入耳中。出走耳前。從缺盆。下腋循胸。過季脅下。邪傳其經，上阻清陽之氣。不能上升。則耳聾。下塞經絡之道。不能通利。則脅痛。胆爲甲木。木喜條達。內寄相火。其汁味苦。邪入於裏。裏氣外拒。故嘔吐。嘔則木氣舒。熱邪內蒸。胆氣上溢。故口苦。柴胡能祛少陽經邪。經邪外達。則裏氣不致受其擾。諸恙自瘳。

□痰實結胸　肝爲將軍。其志善怒。怒則肝氣乘矣。氣有餘。便是火。火灼津液。則生痰。痰窒塞於胸中。則成結胸。或太陽表邪。誤用攻下。表邪內陷。挾痰濁交阻。亦成結胸。柴胡性升。入於肝經。既能舒肝氣。快利胸膈。又能透外邪。升其下陷。

□飲食積聚　水穀入口。胃納脾運。脾氣橫逆。犯胃尅脾。胃失受納之職。脾失健運之權。飲食積聚胃中。致生胸悶脘脹。柴胡長於疎肝理氣。木得條達，土不受制。脾胃健運。得其常度。中土氣和。飲食自化。

□心中煩熱熱入血室　血室下居腹內。肝之所主。爲營血停蓄之所。亦經血集會之處。婦人病傷寒。或溫熱。邪留胸中。心煩身熱。邪勢正在鴟張。倘經水適來。或經水適斷。血室空虛。邪乘虛入。蘊蒸營分。與血相結。病在陰而不在陽。在營而不在氣。故其見症。晝日明了。暮則讝語。如見鬼狀。柴胡性主上升。能提營分之邪外達。苦寒之品。又能清肝熱。

□目赤頭痛　肝臟藏血。氣通於目。血熱上衝。白睛受灌。或生紅絲。或生紅片。胆脉循於頭。肝熱隨胆脉上升。頭弦且痛。痛在兩旁。柴胡苦寒能清。能散肝胆經絡之熱。

□濕痺水脹　脾爲濕土。制水之臟。溼困於內。外達肌膚。身熱沉重。天陰卽發。是爲溼痺。脾虛則土不能制水。水溼妄行。肌肉浮腫。以手按之。膚有凹形。是爲水脹。然脾病肝必來乘。柴胡一能平肝。治其未病。一能扶土。治其已病。肝柔脾健。則水溼內化。痺脹自除。

□肝勞骨蒸　肝勞爲五勞之一。成勞之由。或男子謀慮不遂。或女子志意不從。鬱氣傷肝。肝氣化火。火耗營血。形瘦骨立。午後顴紅。夜熱口乾。舌質光絳。肝勞已著。子病累母。腎水亦虧。熱蒸骨間。則成骨蒸。陝西銀州所產柴胡。性質甘寒。功擅涼血清熱。與江南古城所產柴胡。善於升透外邪。有霄壤之別。陰虛質體。欲清肝熱。銀產柴胡。是爲專長。

□五疳羸熱　五疳卽心肝脾肺腎五臟之疳。小兒多患之。良由飲食不節。積聚生熱。熱伏陰分。形瘦腹大。入夜潮熱。銀柴胡能清陰分之熱。且入肝經。治五疳中之肝疳。厥功甚偉。

幸福書局代售各種良藥

地址上海三馬路雲南路轉角

遺精散
有夢而遺　無夢而洩　久患新起　服之如神
每盒大洋一元

保腦丸
用腦過度　鼻流濁涕　腥臭異常　一服卽愈
每盒大洋五角

白濁丸
白濁初起　溺管刺痛　止濁定痛　效如桴鼓
每盒大洋一元

吐血靈丹
肝火犯肺　肺絡損傷　痰紅吐血　服之立止
每盒大洋五角

獺肝定痛散
女子善鬱　肝病時發　獺肝定痛　靈驗無比
每盒大洋四角

醫藥顧問

本欄由朱振聲醫士答

□痢後餘患

(問)敬啓者。不佞於民國二十年冬間。大解總覺不暢。便後見紙上略有血跡。祇以身體一切如常。並未介意。不料去夏。肚中時發脹痛。肚門作墜。正驚訝間。忽瀉紅白黏液。每日十數次。竟至數十次不等。瀉後間有硬糞少許。幸胃口尙佳。飲食未減。當時疑係痔瘡。但年已而立。素無此疾。有友謂係痢疾。特贈神效治痢末藥。服之無效。秋間延西醫診視。未能確定病原。復經工部局衞生處檢驗大便。斷爲(阿米巴)痢疾。幸蟲不多。卽注射(愛米丁)三五針。卽無血跡。約共注射十七八針之譜。並食(樂特靈)百餘粒。而紅白黏液全無矣。然自此以後。所泄之糞極細。迥異從前。有謂係直腸縮小之故。迄今尙未恢復原狀。且有時似欲大解。而氣洩數聲。糞卽無矣。惟揩之紙上。有白色之濃液。有時略帶紅跡。以鄙意度之。必係痢疾未盡除根所致。似此情形。誠恐復發。更難醫治。爲預防起見。不得不謀除根之法。因思
貴社皆屬國醫名手。經驗宏富。學理湛深。對於不佞之症。必具
高見。且有除根之良方。用將經過顚末。開列上陳。敬請
察核。並乞
不吝教誨。詳細
指示。曷勝感禱。再不佞六年前。曾患胸膛脹悶。數月始瘥。嗣後或數月。或經年。必發一次。發時坐臥不甯。幸不甚劇。飲食亦能如常。只啣荳蔻二三次。經三五日卽愈。未識與痢疾有無關係。一幷
示知。用何藥可以療之。(張靜仁)

(答)足下大約因便時無紅白液。卽斷絕服藥。未經醫生鑑定。故是否斷根。亦難確定。據述近時有白色濃液。有時略帶紅跡。或爲痢後餘患。時發脹悶。與痢疾無關。試服香連丸一星期。服法每日早晚各服五分。開水送下。

□舊病復發

(問)內子前曾患心宕病。惟不時發。昨日覺心中似餓非餓。似饐非饐。口中淡淡無味。喉間乾噫少津。胸中悶悶。故至大世界遊覽。藉以解悶。及觀長人。舊病復發。一時面色蒼白。額出冷汗。手足及兩耳寒冷似冰。後爲解衣。稍停復蘇。仍可下樓。乘車回家。然已受驚不淺。請擬一方。以治此病。定當感恩銘諸肺腑。(張明初)

(答)據來函所述情形。顯係肝病何疑。但時隔數日。而敘述欠詳。殊難懸擬方藥。倘病情如無變更。可用檸檬皮(係向水果店家購其新鮮者)泡汁服。再當就醫診斷。俾從根本解決。

長壽週刊　第二年　第二十八期　二二二

婦女病

難產之研究

—龔敏仁—

夫產育者。天然之常事也。譬如瓜果之成熟者。及時自落。不必憂疑。又如禽獸之分娩者。自然產下。毋庸助手。豈有所謂難產哉。然觀婦人之難產者。常有不鮮。此又何耶。余嘗研究其原因。約有四端。多由于產婦平日失其衛生之道也。一因安逸太過。不事運動。以致骨盤不得舒展。或異常狹小。或特別畸形。則胎兒已到門而不得下。此爲最危險之難產也。西醫須用手術取下。或剖腹取出。然多死而少生也。中醫以此稱爲交骨不開。外貼開骨膏。內服開骨散。尙覺有效。但多數須令熟於接生之穩婆。略用手術以助之。庶能產下也。二因榮養不足。氣血虛弱。氣虛則子宮之收縮乏力。不能推送。血虛則子宮之濡潤不足。不能滑利。故爲難產。此症可用保產無憂散。或人參湯。或桂圓湯。乘熱頻服。以助其推送滑利之力。則兒自易產下矣。三因厚味太過。淫毒留戀。以致生瘡生瘤。阻礙胎兒之產出。此亦難產之一端也。惟此症必于未臨盆之先。早服祛淫解毒之藥。庶可有效。否則臨渴掘井。恐不及矣。四因憂鬱太過。神經鬱結。以致司分娩之中樞神經。不能使子宮收縮。不能追胎兒下出。故致難產也。古人有滑胎飲一方。多用理氣之藥。即爲此症而設也。蓋理氣即舒暢神經。故能有效也。

經帶病治法

大要

宗桐蓀

女子首重調經。一月一行。不慾其期。故經文稱女子之經水。謂月事。後賢又名月信。經水者。取諸經之血。貯於血海而下•其不致崩漏淋滴。任脈爲之擔任。帶脈爲之約束。滿三旬而一下者。以象月盈則虧耳。若非期而至。總名經病。婦人經病。有不調者。有不通者。然不調不通中。有兼疼痛者。有兼發熱者。此分而爲四也。細詳之。不調之中。有趲前。有退後。趲前者熱。退後爲虛。不通之中。有血枯。有血滯。血滯宜攻瘀。血枯宜補。疼痛。有時常作痛。有經前。經後。作痛。常時與經前爲血積。而經後則爲血虛也。發熱。有常時發熱。有經行發熱。常時爲血虛有積。經行爲血虛而有熱也。是四者之中。又分爲八矣。大抵氣行。血行。氣止。血止。故治病以行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝塞。故治血病。以熱藥爲佐。肉桂之類是也。簡易獠病決。如血滯。多服。蔚子。血枯常服二泉膠。室女經閉。肌削汗多。溫補不效。宜用極苦之藥。斂血內入。而下通于衝脈。先令汗止。自然熱退經行。蘆薈丸。日進三服。一月後。日進一服。甚效。

經閉當分虛實

阮金堂

肝傷血枯。載于素問。惡血不去。著于千金。此經閉不行之有虛有實。所當首先辨別者也。經閉之病原。異常複雜。其屬于虛者。則爲血枯肝傷。痰溼中虛。何以言經閉不行。由于血枯肝傷哉。內經謂中焦受氣。取汁變化爲赤。是爲血。設中焦取汁與變化之機能退減。則汁液乏生化之源。經水亦由此而告竭矣。況肝爲剛臟。體陰而用陽。血虛無以養肝。則肝受傷矣。肝虛無以藏血。則血愈枯矣。是故肝愈傷而血愈枯。血愈枯而肝愈傷。血既枯矣。肝既傷矣。經水又安得不斷絕乎。更何言經閉不行由于痰溼中虛哉。蓋中虛者。胃之消化力減少。脾之運輸力薄弱。是故飲食入胃。不能盡化精微。而若干分子。且必稽留于脾胃。醞釀而爲痰溼。于是壅于上者。則爲胸悶脘脹。咳嗽氣逆等症。滯于下者。則爲白帶白淫等症。遂致卵巢與子宮黏膜。發生障礙。而不能照常分泌。病之輕者。則爲經水衰少之症。病之劇者。則成經閉不行之候矣。

經閉之由于實者。上文已約略言之。今當進而言經閉之實症矣。其最普通之病原。則爲瘀血停留。或經來行房。或癥瘕積聚。蓋瘀血充滿。或敗精停滯。癥瘕凝結。必致子宮內膜。發生障礙。而不能分泌，且排泄道路。亦必因阻塞而不通。于是惡血當瀉而不瀉。敗精當去而不去。癥瘕當化而不化。遂致經閉不行。腹大如孕。而成臌脹石瘕。或乾血癆等病矣。噫。同一經閉。而有此虛實之辨。吾人豈可妄認經閉屬實。而妄投攻伐之藥耶。

問病須知

（一）本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積疊如山。仝人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

（二）今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。空函恕不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

（三）凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。

長壽週刊　第二年　第二十八期　二二三

普通病

吐血與職業

（德民）

吐血之患者。近年以來。日見增加。臨診之時。常探求患者之職業。以資比較。其結果勞心者較勞力爲多。初而疑。繼而恍然大悟。大凡血溢於絡。出於口。而成爲失血症者。必由絡脈破裂之故。而絡脈之破裂。必受絕大之震動。勞力之人。負重任遠。操作不息。絡脈之震動必甚。其受傷而吐血。宜也。乃患本症之人。勞心者反多於勞力者。則又何故。是以初而疑也。後經詳細之考察。知勞心者大多爲肺出血。勞力者大多爲胃出血。胃出血來勢雖盛。易於制止。民間流傳之多種止血方。頗多應驗之處。不必延醫診治故覺較少。肺出血來勢雖緩。纏綿難愈。一再就診。往往不見效果。故覺較多。是以恍然大悟。

勞力之工人。因其職業之不善。環境之不良。因肺病而患肺出血者。亦數見不鮮。如印刷工人。翻砂工人。鐵匠。彈棉匠等。空氣混濁。吸入者多汙濁之氣。易於釀或肺癆。轉爲吐血。職業既與吐血有關。吐血之後。能否早日全愈。或延成不治。則與職業上之關係。尤爲重大。蓋吐血之症。貴在休養。過於操心。非其所宜。過於勞力。尤屬大忌。然年來內不景氣現象。到處皆是。生活不易。勞力之人。處境尤感困難。偶有不適。因受經濟之壓迫。子女之養累。祗有抱病從事。不能得一日之休養。其在吐血之人。因身體之不能安靜。血液亦不得安靜。此則大爲可慮者也。

硫黃治疥癬

葉橘泉

疥癬本病。係一種寄生蟲。名疥癢蟲。寄生於皮膚間。且常喜寄生於指側肘腕膝等之關節部。遂發小水皰狀。蕾疹狀。膿皰狀之疹。奇癢不堪。夜間臥蓐後。身體溫暖。癢尤特甚。用天然石硫黃磨細粉。豬脂調勻塗患部。翌日洗淨。再塗擦。再洗。殊有效。

橘泉按。硫黃內含有信石雄黃。或鐵及晒等。爲殺虫。改血。治皮膚病之特效藥。且本品磨擦能發電氣。不過有一種特異臭氣。遇火則易燃燒。其焰爲淡藍色。可以熏白別物。如熏草帽及染燕窩銀耳等。又如病人久住之房屋。慮有細菌微虫病毒沾染。則可緊閉門窗。焚燒本品于其中。可作消毒之用。蓋本品被燒。則化爲硫養三酸氣也。

猪胆汁治黃疸

橘泉

黃疸有數種。而胆石黃疸最多發見。本病之原因。女子或執坐業而缺少運動者。及酒客肉食之輩。每易使胆汁鬱滯。結成胆砂。阻礙輸胆管。致胆汁不能暢輸於十二指腸肝胆部分鬱積胆汁。血管及淋巴管吸收之。逐發生黃胆。蓋胆色素泥入血液。皮膚染黃。呈硫黃色。至橘黃色。尿含胆汁色素。糞便成淡白色。肝臟大而硬且痛。脾藏腫大。右季脊部發疝痛。或發嘔吐。大便往往艱難。如因胆石而發之黃疸。投以猪胆汁。殊合學理。而能奏特效。

橘泉按。動物之胆汁。如豬胆。牛胆等。其形性大略相同。內含鹹性鹽類。及胆色素粘涎等。爲解凝性輕瀉藥。苦味健胃助消化。攻血殺蟲藥。能促胆液之分泌。並消胆道內之一切病原細菌。及結石等。悉使排出。胃腸經胆液之沖洗。則大便通暢。肝胆之疾患如黃疸便祕等悉除。現市德商味吨洋行新出之「胆素靈」卽根據此理而成。還望國內製藥家。將本品設法精製之爲幸。

瘧疾自療法

朱振聲

△小引

自金鷄納霜渡東而來。相率視爲治瘧之靈方妙藥。不論城市僻壤。皆有該項藥品出售。而男女老幼。亦皆知該品之爲治瘧之特效藥矣。然據傳聞之言。及證之事實。則又不然。瘧疾之服金鷄納霜而愈者。固不在少數。然愈而復發。及服之而不見效者。比比然也。推原其故。皆誤於西醫瘧疾由傳染瘧菌之說而起。金雞納霜有殺瘧菌之功能。故以該藥投之。以殺其菌。不論是瘧非瘧。不問致病之原。不察體質之強弱。欲以一藥而統治各不同之瘧症。烏乎可。

本篇詳分瘧症爲二十類。以原因症情之不同。用藥亦各異。對症用藥。詳明簡捷。足以一洗用一藥統治各症之弊。